

1

PRIMARY WOUND DRESSING

Produktbeschreibung

Primäre Wundauflage (Spray) für akute und chronische Wunden.

- 1 enthält Johanniskraut Rotöl (Oleum Hyperici), Neemöl (Oleum Azadirachtae), Propan, Butan.
- 1 ist 100% natürlich.
- 1 bedeckt die Wunde mit einem schützenden Ölfilm.
- 1 verhindert ein Ankleben des Sekundärverbandes und vermindert deshalb Traumatisierung und Schmerzen beim Verbandswechsel.
- 1 schafft ein feuchtes Wundmilieu.
- 1 ist nicht irritierend.

Anwendungshinweise

Beachten Sie, dass lokale hygienische Massnahmen und Wundreinigungsverfahren vor der Applikation von 1 gemäss den medizinischen Standards eingehalten werden müssen.

- 1 Spray vor Gebrauch gut schütteln.
- 1 aus einer Distanz von 5–10 cm direkt ins Wundbett und auf die Wundumgebung sprühen. Sicherstellen, dass die Wunde und die Wundumgebung mit einem deutlichen Ölfilm abgedeckt sind.
- Die Wunde mit einem geeigneten Sekundärverband abdecken (z.B. mit einer Vlieskompressen oder einem Absorber, der dem Wundexudat angepasst ist).
- Nach Gebrauch kann eine minimale Ölmenge am Sprühkopf verbleiben. Dies beeinträchtigt die Funktionalität nicht. Bei Bedarf abwischen.

Tragen Sie mehr Öl auf, falls der Sekundärverband anklebt. Es wird empfohlen die Behandlung alle 24 bis 48 Stunden zu wiederholen.

Kontraindikationen

- Verwenden Sie 1 nicht, wenn zuvor allergische Reaktionen auf einen der Inhaltsstoffe aufgetreten sind.



Achtung: Entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Von Hitze, Funken, offenen Flammen, heissen Oberflächen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Vorsichtsmassnahmen

- Nur zur äusserlichen Anwendung.
- Anzahl Sprühstösse an Wundgrösse anpassen. Nicht mehr als 20 Sprühstösse pro Tag auftragen. Bei Kindern ab 1 Monat bis 2 Jahren nicht mehr als 10 Sprühstösse pro Tag auftragen.
- Da für Neugeborene und Frauen während der Schwangerschaft und Stillzeit keine Daten zur Produktsicherheit vorliegen, ist die Anwendung bei diesen Patientengruppen nicht empfohlen.
- Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden.
- Direkten Kontakt der Spraydose mit der Wunde vermeiden.
- Sprühnebel nicht einatmen.
- Nach wiederholter Anwendung über 30 Tage die Behandlung für 2 Tage unterbrechen.
- Bei Nebenwirkungen wie Hautirritationen oder allergischen Reaktionen den Verband entfernen und den Ölfilm mit Wasser oder Kochsalzlösung abspülen.
- Wenn kein Sekundärverband eingesetzt wird und das behandelte Hautareal der Sonne ausgesetzt ist, kann eine phototoxische Reaktion ausgelöst werden.
- Suchen Sie medizinisches Fachpersonal auf, falls sich der Zustand der Wunde nicht verbessert.
- Eine Wechselwirkung von 1 mit anderen topischen und systemischen Behandlungen wurde nicht untersucht.

Lagerung und Entsorgung

- 1 sollte bei Raumtemperatur gelagert werden (15–25°C). Bitte gemäss lokalen Umweltschutzbedingungen entsorgen.
- 1 darf nur bis zu dem auf dem Behälter und der Faltschachtel mit bezeichneten Datum verwendet werden.

www.wound.ch



Phytoceuticals Ltd, Albisstrasse 33a
8134 Adliswil, Schweiz, +41 43 499 15 66


Die Packungsbeilage wurde zuletzt am 9. März 2018 geprüft.

0344

1.



2.



3.

